

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku



- Založena 2002 , řízena představenstvem
- 125 institucí ze 34 zemí

- **Cíl:** šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění
- **Metoda:**
- evropská síť odborníků pokrývající všechny aspekty prevence karcinomu hrdla děložního
- vytvoření koordinovaných vzdělávacích a informačních a motivačních programů

Vzdělávací kampaně

- **Cílené na:**
- laickou veřejnost
- lékařskou veřejnost, která dále zprostředkovává informace pro laickou veřejnost
- vedoucí pracovníky ve zdravotnictví zodpovědné za implementaci preventivních programů

Vzdělávací materiály

- 3 úrovně:
- letáky poskytující základní informace
- knížky s rozšiřujícími informacemi
- zprávy
- ECCA webová mnohojazyčná stránka
- vypracovány jako konsensus členů a partnerů



Evropský týden prevence karcinomu děložního čípku



Karcinom děložního čípku je jedinečný v tom, že již víme, co přesně máme dělat, abychom zabránili téměř všem případům tohoto nádorového onemocnění. Pomocí účinných screeningových a očkovacích programů můžeme karcinom děložního čípku prakticky eliminovat.

- **Cíl:**
- poskytnout veškeré informace o karcinomu hrdla děložního všem ženám v Evropě, aby porozuměly jak onemocnění vzniká a jak mohou tomuto onemocnění předcházet
- informovat vedoucí pracovníky ve zdravotnictví a politiky v Evropě o výhodách preventivních programů a důležitosti jejich implementace a vylepšování v souladu s novými technologiemi



The Pearl of Wisdom® Campaign
to STOP Cervical Cancer




- Kampaň Perla moudrosti, celoevropská koordinace
 - informace o možnostech prevence
 - přesvědčit ženy, aby stávající možnosti prevence využily
 - podpořit zavedení preventivních programů a jejich vylepšení a rozšíření ve všech státech Evropy

Petice Stop karcinomu hrdla děložního

- vyhlášená organizacemi ECCA, Asociací evropských lig proti rakovině a Mezinárodní unií pro boj s rakovinou
- Lisabonská smlouva EU, vyzývá Komisi při 1 milionu podpisů
- 1/ Petice předána prezidentovi Evropské Unie a evropskému komisaři pro zdraví
- 2/ na národní úrovni petice předána Ministrovi zdravotnictví
- Koordinované aktivity – zájem médií i politiků, zdůraznění důležitosti prevence

(www.CervicalCancerPetition.eu)

HOW IS YOUR COUNTRY DOING?



Evropský týden prevence 2011

- Evropa <http://www.ecca.info/en/campaigns/the-5th-cervical-cancer-prevention-week/member-actions.html>
- Česká republika
- Kampaň Perla moudrosti v ordinacích dětských praktických lékařů
- Informační kampaň pro dárce krve a zaměstnance ÚHKT
- Informační leták
- Informace v médiích



Evropský týden prevence 2011

- **Screening neboli vyhledávání rizikových jedinců**
- V roce 2008 byl v České republice zahájen organizovaný program, tzn. všechny složky programu by měly být definovány a kontrolovány a ženy by na kontrolní vyšetření měly být aktivně zvány. Zavedením takto nastaveného programu by měl v naší republice perspektivně klesat počet nových případů karcinomu děložního hrdla
- Byly ustanoveny akreditované cytologické laboratoře, které jsou pravidelně kontrolovány (jiným laboratořím není vyšetření gynekologické cytologie propláceno). Nyní je akreditovaných 43 laboratoří. Seznam laboratoří najdete www.cervix.cz.
- Interval prohlídek u gynekologa placený z povinného zdravotního pojištění je i nadále jeden rok.
- V roce 2011 by měly být, dle vyjádření MZ ČR a ZP, ženy cílové skupiny (25-60 let věku), které neabsolvovaly 2 roky preventivní prohlídku u gynekologa, pozvány na vyšetření.

Evropský týden prevence 2011

Očkování proti HPV

- Na trhu jsou dostupné stále dvě vakcíny pro preventivní očkování proti infekci typy lidských papillomavirů, které nejčastěji vyvolávají nádorová onemocnění.
- V České republice lze očkování doporučit před 15 rokem věku. Tento údaj vychází ze studie rozšíření HPV ve zdravé populaci (studie NRL pro papillomaviry, ÚHKT).
-
- Vakcíny jsou bezpečné, vyvolávají tvorbu vysokých hladin protilátek téměř u všech vakcinovaných a jsou velmi účinné v prevenci onemocnění asociovaných s typy HPV obsaženými ve vakcíně po dlouhou dobu.
- Ze zemí, kde zahájili plošnou vakcinaci, jsou publikována data, která ukazují na snížení výskytu přednádorových stavů v anogenitálním traktu žen spojených s vakcinačními typy papillomavirů. Mimo to klesá i počet nutných léčebných invazivních zákroků (konizace).